

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, INVESTIGAȚII ȘI TRATAMENT

SCHIZOFRENIA, TULBURĂRILE SCHIZOTIPALE ȘI DELIRANTE

I DIAGNOSTIC: conform ICD 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament

II INVESTIGAȚII:

- **BIOLOGICE:** glicemie, uree sanguină, ionograma, examen sumar de urină
- **FUNCȚIONALE:** EKG, EEG, MRF
- **PSIHOLOGICE**

III INDICAȚII TERAPEUTICE:

- **MEDICAMENTOASE**

NEUROLEPTICE clasice, sau atipice (haloperidol, zuclopentixol, risperidona, olanzapina, clozapina, amisulpirid, sulpirid, quetiapina, ziprasidona)

DCI	Den.comercială	Doza
Haloperidol	Haloperidol	1,5-120 mg zi
Zuclopentixol	Clopixol Acufaze	20-150mg zi
Zuclopentixol depot	Clopixol depot 200 mg	100-600mg săpt
Flupentixol decanoat	Fluanxol	12,5-400 mg săpt
Haloperidol decanoat	Haloperidol decanoat 50mg	12,5-75mg săpt
Clozapina	Leponex	200-900mg
Sulpirid	Dogmatil, eglonil	400-2400mg zi
Tiaprida	Tiapridal	
Amisulpirid	Solian	200-1200mg
Quetiapina fumarat	Seroquel	75-750mg
Olanzapina	Ziprexa	10-20mg
Ziprasidona	Zeldox	40-80 mg
Risperidona	Rispen	3-8mg
Clorpromazin	Plegomazin	100-200mg zi
Droperidol	Droleptan	75-200mg zi
Levomepromazina	Levomepromazin	75-150 mg zi

INDICAȚIILE NEUROLEPTICELOR ATIPICE:

- Primul episod de boală
- Recădere acută
- Manifestări extrapiramidale cu reacții distonice: olanzapina, quetiapina
- Hiperprolactinemie: olanzapina, quetiapina
- Simptome negative redutabile și non-responsive: olanzapina, quetiapina, amisulpirid
- Refractanță terapeutică, intoleranță la antipsihotice tipice: clozapina
- Disabilități sociale, fizice, diskinezia tardivă: clozapina
- Tulburări cognitive: clozapina

ORTOTIMIZANTE: carbamazepina, depakine, lamotrigina

ANTIDEPRESIVE: mianserinum (mianserin), clomipramina (anafranil), sertalina (serlift, zoloft), tianeptina (coaxil), tritico, venlafaxina (efectin)

ANXIOLITICE: tranchilizante benzodiazepinice, inclusiv benzodiazepine cu proprietăți hipnotice și tranchilizante nebenzodiazepinice (meprobamat, hidroxizin, betablocante, clometiazol)

NOOANALEPTICE (STIMULANTE ALE VIGILITĂȚII): cu acțiune directă: cofeina, nicetamida, sulfat de stricnină, bemegrid, heptaminol, amine simpatomimetice: efedrina, amfetamine, psihotone cu acțiune simpatomimetică redusă: metilfenidat, psihotone de reglare metabolică: centrofenoxina (centedrin), piritoxina (encefabol), acid glutamic, extracte de creier (crelizin), lecitine, vitamine grup B, produși hormonal.

ANTIPARKINSONIENE: amantadina, benztropina, trihexifenidil, difenhidramina, biperidina, procyclidina, beta-blocante, lorazepam, clonazepam, diazepam

• **ALTE TERAPII PENTRU RECUPERARE**

Consiliere individuală

Consiliere familială

Psihoterapie de grup

Psihoterapie individuală

Terapie ocupațională

Ergoterapie

V INDICAȚII DE INTERNARE:

- Refuzul tratamentului psihotrop ambulator
- Patologii asociate
- Pacientul agresiv

VI TRATAMENTUL PATOLOGILOR ASOCIATE: funcție de ghidul practic recomandat de medicul specialist pentru patologia respectivă

- Orice afecțiune somatică: T.B.C., infecția cu virus HIV, hepatite cronice, etc.
- Afecțiuni asociate consumului abuziv de alcool

VII EXTERNARE cu indicații de regim igieno-dietetic și de dispensarizare, scrisoare medicală

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, INVESTIGAȚII ȘI TRATAMENT

TULBURĂRI AFECTIVE

I DIAGNOSTIC: conform ICD 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament

II INVESTIGAȚII:

- BIOLOGICE: glicemie, uree sanguină, ionograma, examen sumar de urină
- FUNCȚIONALE: EKG, EEG, MRF
- PSIHOLOGICE

III INDICAȚII TERAPEUTICE:

- **MEDICAMENTOASE**

ANTIDEPRESIVE: mianserinum (mianserin), clomipramina (anafranil), sertalina (serlift, zoloft), tianeptina (coaxil), tritico, venlafaxina (efectin)

ANTIDEPRESIVE:

DCI	Den.comercială	Doza
Imipramina	Antidepressin	
Clomipramina	Anafranil	
Amitriptilina	Amitriptilina	
Nortriptilina	Nortriptilin	
Doxepina	Doxepin	
Maprotilina	Ludiomil	
Mianserina	Mianserin	
Dibenzoxazepina	Amoxapina	
Bupropion	Buspar	
Viloxazina	Vivalan	
Trazodona	Trittico	
Fluvoxamina	Floxifral	mg zi
Fluoxetina	Prozac	20-40mg zi
Citalopram	Cipramil	
Sertalina	Serlift	50- mg zi
Paroxetina		

NEUROLEPTICE clasice, sau atipice (haloperidol, zuclopentixol, risperidona, olanzapina, clozapina, amisulpirid, sulpirid, quetiapina)

ORTOTIMIZANTE: carbamazepina, depakine, lamotrigina

ANXIOLITICE: tranchilizante benzodiazepinice, inclusiv benzodiazepine cu proprietăți hipnotice și tranchilizante nebenzodiazepinice (meprobamat, hidroxizin, betablocante, clometiazol)

NOOANALEPTICE (STIMULANTE ALE VIGILITĂȚII): cu acțiune directă: cofeina, nicetamida, sulfat de stricnină, bemegrid, heptaminol, amine simpatomimetice: efedrina, amfetamine, psihotone cu acțiune simpatomimetică redusă: metilfenidat, psihotone de reglare metabolică: centrofenoxina (centedrin), piritoxina (encefabol), acid glutamic, extracte de creier (crelizin), lecitine, vitamine grup B, produși hormonal.

ANTIPARKINSONIENE: amantadina, benztropina, trihexifenidil, difenhidramina, biperidina, procyclidina, beta-blocante, lorazepam, clonazepam, diazepam

• **ALTE TERAPII PENTRU RECUPERARE**

Consiliere individuală

Consiliere familială

Psihoterapie de grup

Psihoterapie individuală

Terapie ocupațională

Ergoterapie

V INDICAȚII DE INTERNARE:

- Refuzul tratamentului psihotrop ambulator
- Patologii asociate
- Pacientul cu risc suicidar

VI TRATAMENTUL PATOLOGILOR ASOCIATE: funcție de ghidul practic recomandat de medicul specialist pentru patologia respectivă

- Orice afecțiune somatică: T.B.C., infecția cu virus HIV, hepatite cronice, etc.
- Afecțiuni asociate consumului abuziv de alcool

VII EXTERNARE cu indicații de regim igienico-dietetic și de dispensarizare, scrisoare medicală

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, INVESTIGAȚII ȘI TRATAMENT

DEMENTE

I DIAGNOSTIC: conform ICD 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament

II INVESTIGAȚII:

- **BIOLOGICE:** glicemie, uree sanguină, ionograma, examen sumar de urină
- **FUNCȚIONALE:** EKG, EEG, MRF
- **PSIHOLOGICE**

III INDICAȚII TERAPEUTICE:

• **MEDICAMENTOASE**

ANTIDEMENTIALE: donepezil (aricept 5-10mg zi), rivastigmina (exelon 1,5-6mg zi), memantina (ebixa: 10-20mg zi)

ANTIDEPRESIVE: mianserinum (mianserin), clomipramina (anafranil), sertalina (serlift, zoloft), tianeptina (coaxil), tritico, venlafaxina (efectin)

NEUROLEPTICE clasice, sau atipice (haloperidol, zuclopentixol, risperidona, olanzapina, clozapina, amisulpirid, sulpirid, quetiapina)

ANXIOLITICE: tranchilizante benzodiazepinice, inclusiv benzodiazepine cu proprietăți hipnotice și tranchilizante nebenzodiazepinice (meprobamat, hidroxizin, betablocante, clometiazol)

NOOANALEPTICE (STIMULANTE ALE VIGILITĂȚII): psihotone cu acțiune simpatomimetică redusă: metilfenidat, psihotone de reglare metabolică: centrofenoxina (centedrin), piritoxina (encefabol), acid glutamic, extracte de creier (crelizin), lecitine, vitamine grup B.

• **ALTE TERAPII PENTRU RECUPERARE**

Consiliere individuală

Consiliere familială

Terapie ocupațională

V INDICAȚII DE INTERNARE:

- Refuzul tratamentului psihotrop ambulator
- Patologii asociate
- Pacientul cu risc suicidar

VI TRATAMENTUL PATOLOGILOR ASOCIATE: funcție de ghidul practic recomandat de medicul specialist pentru patologia respectivă

VII EXTERNARE cu indicații de regim igienico-dietetic, supraveghere, instituirea măsurilor protective legale (asistent personal) și de dispensarizare, scrisoare medicală

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, INVESTIGAȚII ȘI TRATAMENT

TULBURĂRI PSIHICE DATORATE CONSUMULUI DE ALCOOL

I DIAGNOSTIC: conform ICD 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament

II INVESTIGAȚII:

- **BIOLOGICE:** glicemie, uree sanguină, ionograma, examen sumar de urină
- **FUNCȚIONALE:** EKG, EEG, MRF
- **PSIHOLOGICE**

III INDICAȚII TERAPEUTICE:

- **MEDICAMENTOASE**

CURA DE DEZINTOXICARE: vitamine grup B, C, aspatofort, ser glucozat,

ANXIOLITICE: **ANXIOLITICE:** tranchilizante benzodiazepinice, inclusiv benzodiazepine cu proprietăți hipnotice și tranchilizante nebenzodiazepinice (meprobamat, hidroxizin, betablocante, clometiazol)

NOOANALEPTICE (STIMULANTE ALE VIGILITĂȚII): cu acțiune directă: cofeina, nicetamida, sulfat de stricnină, bemegrid, heptaminol, amine simpatomimetice: efedrina, amfetamine, psihotone cu acțiune simpatomimetică redusă: metilfenidat, psihotone de reglare metabolică: centrofenoxina (centedrin), piritoxina (encefabol), acid glutamic, extracte de creier (crelizin), lecitine, vitamine grup B, produși hormonal.

• **ALTE TERAPII PENTRU RECUPERARE**

Consiliere individuală

Consiliere familială

Psihoterapie de grup

Psihoterapie individuală

Terapie ocupațională

Ergoterapie

V INDICAȚII DE INTERNARE:

- Refuzul tratamentului psihotrop ambulator
- Patologii asociate
- Pacientul cu risc suicidar

VI TRATAMENTUL PATOLOGILOR ASOCIATE: psihice, sau somatice: depresia, tulburări de personalitate, altele:

ANTIDEPRESIVE: tianeptina (coaxil)

NEUROLEPTICE (haloperidol, zuclopentixol, amisulpirid, sulpirid)

ORTOTIMIZANTE: carbamazepina, depakine, lamotrigina

MEDICAȚIE SPECIFICĂ, funcție de ghidul practic recomandat de medicul specialist pentru patologia respectivă

- Orice afecțiune somatică: T.B.C., infecția cu virus HIV, hepatite cronice, etc.
- Afecțiuni asociate consumului abuziv de alcool

VII EXTERNARE cu indicații de regim igieno-dietetic și de dispensarizare, scrisoare medicală

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, INVESTIGAȚII ȘI TRATAMENT
TULBURĂRI ALE PERSONALITĂȚII ȘI COMPORTAMENTULUI LA
ADULT

I DIAGNOSTIC: conform ICD 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament

II INVESTIGAȚII:

- **BIOLOGICE:** glicemie, uree sanguină, ionograma, examen sumar de urină
- **FUNCȚIONALE:** EKG, EEG, MRF
- **PSIHLOGICE**

III INDICAȚII TERAPEUTICE:

• **MEDICAMENTOASE**

ANTIDEPRESIVE: mianserinum (mianserin), clomipramina (anafranil), sertalina (serlift, zoloft), tianeptina (coaxil), tritico, venlafaxina (efectin)

NEUROLEPTICE clasice, sau atipice (haloperidol, zuclopentixol, risperidona, olanzapina, clozapina, amisulpirid, sulpirid, quetiapina)

ORTOTIMIZANTE: carbamazepina, depakine, lamotrigina

ANXIOLITICE: tranchilizante benzodiazepinice, inclusiv benzodiazepine cu proprietăți hipnotice și tranchilizante nebenzodiazepinice (meprobamat, hidroxizin, betablocante, clometiazol)

NOOANALEPTICE (STIMULANTE ALE VIGILITĂȚII): cu acțiune directă: cofeina, nicetamida, sulfat de stricnină, bemegrid, heptaminol, amine simpatomimetice: efedrina, amfetamine, psihotone cu acțiune simpatomimetică redusă: metilfenidat, psihotone de reglare metabolică: centrofenoxina (centedrin), piritoxina (encefabol), acid glutamic, extracte de creier (crelizin), lecitine, vitamine grup B, produși hormonal.

ANTIPARKINSONIENE: amantadina, benztropina, trihexifenidil, difenhidramina, biperidina, procyclidina, beta-blocante, lorazepam, clonazepam, diazepam

• **ALTE TERAPII PENTRU RECUPERARE**

Consiliere individuală

Consiliere familială

Psihoterapie de grup

Psihoterapie individuală

Terapie ocupațională

Ergoterapie

V INDICAȚII DE INTERNARE:

- Refuzul tratamentului psihotrop ambulator
- Patologii asociate
- Pacientul cu risc suicidar

VI TRATAMENTUL PATOLOGILOR ASOCIATE: funcție de ghidul practic recomandat de medicul specialist pentru patologia respectivă

VII EXTERNARE cu indicații de regim igienico-dietetic și de dispensarizare, scrisoare medicală

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, INVESTIGAȚII ȘI TRATAMENT

TULBURĂRI PSIHICE ORGANICE

I DIAGNOSTIC: conform ICD 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament

II INVESTIGAȚII:

- **BIOLOGICE:** glicemie, uree sanguină, ionograma, examen sumar de urină
- **FUNCȚIONALE:** EKG, EEG, MRF
- **PSIHOLOGICE**

III INDICAȚII TERAPEUTICE:

- **MEDICAMENTOASE**

TRATAMENTUL SPECIFIC AL AFECȚIUNII SOMATICE, conform protocolului terapeutic stabilit de medicul specialist

ANTIDEPRESIVE: mianserinum (mianserin), clomipramina (anafranil), sertalina (serlift, zoloft), tianeptina (coaxil), tritico, venlafaxina (efectin)

NEUROLEPTICE clasice, sau atipice (haloperidol, zuclopentixol, risperidona, olanzapina, clozapina, amisulpirid, sulpirid, quetiapina)

ORTOTIMIZANTE: carbamazepina, depakine, lamotrigina

ANXIOLITICE: tranchilizante benzodiazepinice, inclusiv benzodiazepine cu proprietăți hipnotice și tranchilizante nebenzodiazepinice (meprobamat, hidroxizin, betablocante, clometiazol)

NOOANALEPTICE (STIMULANTE ALE VIGILITĂȚII): cu acțiune directă: cofeina, nicetamida, sulfat de stricnină, bemegrid, heptaminol, amine simpatomimetice: efedrina, amfetamine, psihotone cu acțiune simpatomimetică redusă: metilfenidat, psihotone de reglare metabolică: centrofenoxina (centedrin), piritoxina (encefabol), acid glutamic, extracte de creier (crelizin), lecitine, vitamine grup B, produși hormonal.

ANTIPARKINSONIENE: amantadina, benztropina, trihexifenidil, difenhidramina, biperidina, procyclidina, beta-blocante, lorazepam, clonazepam, diazepam

• **ALTE TERAPII PENTRU RECUPERARE**

Consiliere individuală

Consiliere familială

Psihoterapie de grup

Psihoterapie individuală

Terapie ocupațională

Ergoterapie

V INDICAȚII DE INTERNARE:

- Refuzul tratamentului psihotrop ambulator

- Patologii asociate
- Pacientul cu risc suicidar

VI TRATAMENTUL PATOLOGILOR ASOCIATE: funcție de ghidul practic recomandat de medicul specialist pentru patologia respectivă

- Orice afecțiune somatică: T.B.C., infecția cu virus HIV, hepatite cronice, etc.
- Afecțiuni asociate consumului abuziv de alcool

VII EXTERNARE cu indicații de regim igieno-dietetic și de dispensarizare, scrisoare medicală